



ประเภท : บทความ

หัวข้อข่าว : อันตรายจากสารฟิลเลอร์ (ด้านสุขภาพ)

โดย : สมจิตร

ลงวันที่ : สัปดาห์ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

เข้าชม : 3922

เรื่อง อันตรายจากสารฟิลเลอร์

สังคมไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องความสวยความงามอย่างมาก ผลลัพธ์ด้านความงาม อาหารเสริม หรือการศัลยกรรมกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยไม่ได้คำนึงถึงอันตรายหรือผลข้างเคียงของสิ่งเหล่านั้น ขบวนการเสียชีวิตหรือการพิการจากศัลยกรรมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจึงมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักช้อปปิ้งออนไลน์ อยากหล่อ อยากหล่อ ที่มีความต้องการเสริมจมูก เสริมคาง แก้ไขปัญหากรวยของผิวหนังเนื่องมาจากวัย ริ้วรอยบริเวณหน้าผาก หางตา และเติมเต็มร่องแก้ม โดยสารเติมเต็มนั้นแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบได้แก่ ๑. แบบชั่วคราว มีอายุการใช้งานประมาณ ๔ – ๖ เดือน แต่มีความปลอดภัยสูง สลายตัวได้เองตามธรรมชาติ ๒. แบบกึ่งถาวร (Semi Permanent Filler) หลังฉีดแล้วจะอยู่ในผิวตลอดไป ไม่สลายตามธรรมชาติ มักพบผลข้างเคียงในระยะยาว (ปัจจุบันแพทยสภา ได้มีประกาศห้ามใช้ฟิลเลอร์ชนิดถาวรอย่างเด็ดขาด) ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ประธานสมัชชาสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณนั้นใช้หลักการ คือ ผิวหนัง ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ คือ โยคอลลาเจนและสารไฮยาลูโรนิก ที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำมากกว่าตัวเองหลายร้อย หรือพันเท่า มีหน้าที่สำคัญเป็นองค์ประกอบที่ให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นแก่ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณมีรูปทรงเต่งตึง แต่เมื่อผ่านเข้าสู่วัยชรา จะพบว่า โยคอลลาเจนและสารอุ้มน้ำจะค่อยๆมีปริมาณลดน้อยลง เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น เพื่อแก้ไขภาวะดังกล่าว

จึงมีความพยายามหาทางแก้ไขโดยการฉีดสารจากภายนอกเข้าไปในผิวหนัง เพื่อทดแทนหรือที่เรียกกันว่าฟิลเลอร์ (Filler)”

ปัจจุบันมีการลักลอบฉีดฟิลเลอร์ และมีการลักลอบฉีดฟิลเลอร์ โดยผู้ฉีดไม่ใช่แพทย์ โดยจะฉีดค่าบริการดูหมิ่นกว่าการฉีดยาที่แพทย์เนื่องจากใช้สารฟิลเลอร์ปลอมหรือฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการอันตรายอย่างมาก เพราะสารฟิลเลอร์เข้าไปในกระแสเลือด เข้าสู่สมอง เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน

เป็นอันตราย อันตรายได้

นอกจากนี้ ผลข้างเคียงที่ถือว่าอันตรายมาก คือ การฉีดฟิลเลอร์ผิดตำแหน่งโดยฉีดเข้าไปในหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณดวงตา

ทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันจนตาบอดถาวรได้ เนื่องจากดวงตาสามารถทนสภาพการขาดเลือดได้แค่ ๔๐ นาที เท่านั้น ต่างจากผิวหนังที่ทนได้ ๖ ชั่วโมง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดจากกระบวนการฉีดที่มีการรั่วไหลของ

ฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงประสาทตา

ทำให้ตาบอดถาวรตลอดชีวิต

ดังนั้นจึงควรสังเกตุสังเกตุฟิลเลอร์ว่ากำลังไปทำประโยชน์อะไรอยู่หรือไม่ เช่น สารที่ฉีดต้องมั่นใจได้ว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ผ่านการรับรองจาก อย. ไม่ใช่ฟิลเลอร์ราคาถูกที่ขายตามเว็บไซต์หรือหน้าร้านอย่างผิดกฎหมาย และสารฉีดกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รูปผลการฉีดก็ดูต้องเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ปริมาณและตำแหน่งที่ฉีดได้แม่นยำ มิฉะนั้นหากฉีดผิดตำแหน่งอาจทำให้เกิดอันตรายที่อาจถึงชีวิตได้สถานที่ดี ต้องฉีดยาในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีเครื่องมือช่วยชีวิตขณะฉีดยา และที่สำคัญคนที่ต้องการฉีด

ก็ควรดูว่าสภาพร่างกายของตัวเองหรือเพื่อน โดยจะต้องไม่เป็นคนที่เลือดออกง่าย หรือมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง ห้ามฉีดกรวยแก้มหรือกรวยอื่นๆ เพราะคนที่ฉีดกรวยแก้มหรือกรวยอื่นๆอาจมีโอกาสมองสูงถึงไม่ฉีดยาฟิลเลอร์เด็ดขาด

โดย ปัทมาวี เพลอสม

เรื่องเรื่องโดย สมจิตร จาตุก