



ประเภท : บทความ

หัวข้อข่าว : โรคระบาดในมะพร้าวช่วงฤดูแล้ง (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

โดย : สมจิตร

ลงวันที่ : อังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

เข้าชม : 2402

เรื่อง : โรคระบาดในมะพร้าวช่วงฤดูแล้ง

การสูญเสียต้นมะพร้าวจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง

กอบปรักมีแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดอย่างหนัก

จากการที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร ได้รับความเสียหายจากศัตรูมะพร้าว

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนมะพร้าวถึงขั้นวิกฤต

เพราะอาหารไทยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวเป็นหลัก

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตกะทิสำเร็จรูป

การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

การประกอบอาหารที่ต้องใช้กะทิเป็นส่วนผสมอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน

เป็นสาเหตุให้ประเทศต้องนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้

รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศ

จึงได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข

จากส่วนราชการและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย

เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหายั่งยืน

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 นี้

การลักลอบนำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมายจากต่างประเทศ

เป็นสาเหตุหนึ่งของการนำแมลงศัตรูพืชเข้ามา

รัฐบาลจึงได้อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศเท่านั้น คือ
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม
ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรและประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนห้วดำ เพื่อขจัดปัญหา
การแพร่ระบาดให้หมดไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการขีปนุญหาระยะสั้น
และระยะยาว 5 แนวทางหลัก คือ 1.
เร่งตัดทางใบที่ถูกหนอนห้วดำทำลายและนำมาเผา 2. พันด้วยเชื้อ BT 3.
ปล่อยแตนเบียน 4. พันสารเคมีทางใบ และ 5.
ฉีดสารเคมีเข้าต้นตามหลักวิชาการที่ไม่ส่งผลต่อผู้บริโภค
และยังได้วางแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.
ควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนห้วดำ
โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่พบการระบาด

2. สร้างความมั่นใจในการใช้สารเคมี
และวิธีการทางวิชาการที่เหมาะสมในการควบคุม การแพร่ระบาด 3.
การขอความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสวน ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยผลักดันไม่ให้หนอนห้วดำแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น

การเฝ้าระวังและการป้องกัน หนอนห้วดำ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากมีการนำต้นปาล์มประดับ
และต้นมะพร้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ผู้นำเข้าต้องตรวจสอบว่ามีหนอนของแมลงดำหนาม
หรือหนอนห้วดำติดไปด้วยหรือไม่
เพื่อป้องกันมิให้แมลงเหล่านี้กระจายออกไปยังท้องที่อื่น ๆ
เมื่อพบให้ตัดใบที่ถูกทำลายลงมาเผาหรือฝังทันที ไม่ควรกองไว้ที่พื้น
เป็นการตัดวงจร ซึ่งจะช่วยลดการระบาดได้ดีที่สุด

2. อย่าลักลอบนำมะพร้าว
หรือพืชตระกูลปาล์มจากประเทศอื่นเข้ามาในประเทศไทย
ควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เพราะด่านตรวจพืชจะช่วยตรวจสอบว่ามีแมลงศัตรูพืชติดมาด้วยหรือไม่ ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีโรชนิดหนึ่งเรียกว่า “โรสีขา”

ติดเข้ามากับต้นมะพร้าวมีการระบาดรุนแรงยิ่งกว่าแมลงดำหนามหรือหนอนหัวดำมะพร้าว ดังนั้น ควรนำมะพร้าวเข้ามาให้ถูกต้องกฎหมาย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำซ้อน

3. การทำลายแมลงศัตรูมะพร้าว จากต้นมะพร้าว ต้นปาล์ม ต้นตาลโตนด ไม่แนะนำให้พ่นยาเนื่องจากเป็นพืชต้นสูง

เพราะละอองยาจะร่วงลงมาถึงคนพ่นยาทำให้ได้รับอันตราย

ควรตัดทางใบมะพร้าวและดึงลงมาเผาทำลายหรือฝังแล้วฉีดพ่นยาใบที่เหลือ

นอกจากนี้ ควรมีการบำรุงดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทำความสะอาดปลูกแซมมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนมะพร้าวอายุมากควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ปลูกใหม่ หามะพร้าวพันธุ์ดีมาปลูกแซมพืชอื่น ๗

ดำเนินการปลูกในรูปแบบกลุ่มผ่านสถาบันเกษตรกรการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า และปลูกมะพร้าวตามวัตถุประสงค์ของตลาด

ในอนาคตอาจจะมีแมลงศัตรูพืชตัวใหม่ ๗

เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร

เกษตรกรหรือประชาชนที่นำพืชจากต่างประเทศเข้ามา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีการตรวจตามขั้นตอน อาจทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวม

หากเราต้องการเป็นประเทศที่ส่งออกมะพร้าวมากที่สุดในโลก

และการเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ไม่ให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ เกิดขึ้นอีก

โดย ณัฐชา เหมือนสมหวัง

เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก